

Erratum

จากบทบรรณาธิการ โรคฮีโมฟีเลีย โดย ยิ่งยง ชินธรรมมิตร
สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หน้า 191 ย่อหน้าที่ 4

ข้อความที่แก้ไข

ในวารสารเล่มนี้ มีนิพนธ์ต้นฉบับ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยฮีโมฟีเลียไทยที่ได้รับ prophylaxis ด้วยแฟคเตอร์ขนาด
ต่ำ (5-10 ยูนิต/กก./ครั้ง ฉีด 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์) เปรียบเทียบ
กับกลุ่มที่ได้รับแฟคเตอร์เมื่อมีอาการ⁶ พบว่า กลุ่มผู้ป่วยโรคฮีโม-
ฟีเลียชนิดรุนแรงมาก ช่วงอายุ 8-16 ปีที่ได้รับ prophylaxis มี
คุณภาพชีวิตดีกว่ากลุ่มที่ได้รับแฟคเตอร์เมื่อมีอาการอย่างชัดเจน
(p -value = 0.036) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกายภาพ ครอบคลุม
กีฬา งานอดิเรก และการรักษา ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้

นี้ที่พบประโยชน์ในกลุ่มผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลียชนิดรุนแรงมากชัดเจน
กว่ากลุ่มชนิดรุนแรงปานกลาง⁷ แสดงว่า ปริมาณแฟคเตอร์ที่ใช้ใน
การป้องกันที่มีขนาดต่ำกว่าที่แนะนำโดยทั่วไปในต่างประเทศ ยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ในแง่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยฮีโมฟี-
เลียชนิดรุนแรงมาก ช่วงอายุ 8-16 ปีได้ แม้จะพบว่า กลุ่มที่ได้
prophylaxis มีการใช้แฟคเตอร์มากกว่ากลุ่มที่ได้รับแฟคเตอร์
เมื่อมีอาการอย่างชัดเจน (63.8 เทียบกับ 28.6 ยูนิต/กก./เดือน;
 p -value = 0.01) ก็ควรพิจารณาปรับใช้ prophylaxis ด้วยแฟค-
เตอร์ขนาดต่ำในผู้ป่วยเด็กไทย และควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมต่อไป
ในกลุ่มผู้ป่วยอายุมากกว่า 16 ปี ถึงขนาดแฟคเตอร์ที่เหมาะสม
และเข้าถึงได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
มีทุนสนับสนุนการทำวิจัย การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
และทุนส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ แก่สมาชิกของสมาคมฯ
ทั้งนี้สมาชิกสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
ของสมาคมโลหิตวิทยา: www.tsh.or.th